

ЭФФЕКТИВНО

ПРИМЕНЯТЬ

S-

МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ

W+

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

ЛУЧШЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ

W-

НЕ ПРИМЕНЯТЬ

S-

НЕЭФФЕКТИВНО

АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

НЕОНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Аntenатальный прием кортикостероидов
Нейропротекция

Сульфат магния
Нейропротекция

Кофеин
Экстубация

Гипотермия
Лечение при асфиксии
Профилактика кортикальных нарушений зрения

Эритропоэтин
Нейропротекция

Эритропоэтин
Переливание эритроцитов

Индометацин (Профилактически)
Предотвращение открытия артериального протока

Фенобарбитал
↓ Асфиксия

Постнатальный прием кортикостероидов
При высоком риске развития бронхопупульмональной дисплазии

Сурфактант
↓ Респираторный стресс

Противогипертензивные препараты
↓ Гипертония

Бета-миметики
Недошенность

Прогестерон
↓ Недошенность

Ацикловир
↓ Простой герпес

Антигрибковые препараты
↓ Грибковая инфекция

Кофеин
Апноэ

CPAP
Профилактика механической вентиляции

Гель с декстрозой
↓ Гипогликемия

Добутамин
↓ Гипотензия

Антагонисты рецепторов эндотелина
↓ Легочная гипертензия

Дегидратация
Объем Сыворотка Билирубин

Высоочастотная вентиляция легких
Острая легочная дисфункция

Ибупрофен
↓ Открытый артериальный проток

Гидрокортизон
Помогает при бронхопупульмональной дисплазии

Метод «кенгуру»
Регулярное дыхание

Фокус на сатурации кислорода
Профилактика ЦП

Фототерапия
Профилактика желтухи

Оксид азота
↓ Дыхательная недостаточность <3 дней +/- бронхопупульмональная дисплазия

Комнатный воздух
Реанимирование

Силиконовые беруши
↓ Стресс

Тиреоидные гормоны
↓ Нарушения нейроразвития

Антибиотики
↓ Преждевременные роды

Постоянная кардиотокография
↓ Нарушения состояния плода

Немедленная стимуляция родов
↓ Дистресса плода у недоношенных

Запланированная стимуляция родов
↓ Преэклампсия

Фенобарбитал
↓ Интра-вентрикулярная геморрагия

Витамин К
↓ Пери-вентрикулярная геморрагия

Аргинин
Профилактика некротического энтероколита

Дарбэпоэтин Альфа
Профилактика переливания эритроцитов

Этамзилат
Профилактика перивентрикулярной геморрагии

Добавки глутамина
Парентеральное кормление

Оксид азота
↓ Дыхательная недостаточность <3 дней

Удлиненное время вдоха
Механическая ИВЛ

Постнатальный прием кортикостероидов (Ранний или поздний небольшой риск хронических заболеваний легких)
Профилактика бронхопупульмональной дисплазии

Переливание крови
Анемия

ТОЛЬКО описательные исследования

1-3 РКИ

4-15 РКИ

15+ РКИ